


Projet suprarégional d'analyse de drogues dans l'urine de personnes qui consomment au Québec – 2025




Résultats de la région de Montréal



Description du projet

- Questionnaire rempli par les consommateurs sur leur consommation de drogues, leur expérience de surdose et la réduction des méfaits
- Collecte et analyse d'un échantillon d'urine
- 1509 participants, dans 14 régions du Québec, du 5 septembre au 19 octobre 2025
- Critères de recrutement: Avoir consommé au moins une drogue dans les 3 derniers jours (excluant le cannabis) et avoir 18 ans ou +

Résultats pour les 384 participants de Montréal recrutés dans 9 organismes



Principales substances rapportées consommées (<3 jours)


- Crack et freebase..... 67 %
- Crystal meth..... 31 %
- Hydromorphone..... 21 %
- Speed..... 20 %
- Fentanyl en poudre..... 20 %
- Cocaïne en poudre..... 20 %
- Méthadone.....12%
- Benzodiazépines.....12%

Principales substances détectées dans l'urine

- Cocaïne..... 89 %
- Méthamphétamine..... 69 %
- Fentanyl et analogues..... 26 %
- Hydromorphone..... 21 %
- Méthadone..... 14 %
- Médétomidine..... 13 %
- Cyclorphine.....13 %
- Morphine..... 13 %

Autres substances d'intérêt détectées dans l'urine

- Héroïne..... 10 %
- Kétamine..... 9 %
- Xylazine..... 6 %
- Benzos non-commercialisés. 3 %



Mode de consommation lors de la ou des dernières surdoses

- Avalé..... 10 %
- Sniffé.....6 %
- Fumé.....43 %
- Injecté.....48 %

Faits saillants

- À Montréal, les substances de la famille des stimulants demeurent les plus souvent rapportées consommées et détectées lors des 3 jours précédant l'entrevue.
- Les données démontrent que les substances adultérantes consommées à « l'insu », qui se retrouve vraisemblablement dans le fentanyl en poudre, sont différentes pour la période de collecte de 2025 comparées aux années antérieures. En 2025, la détection de benzodiazépines non-commercialisées et de xylazine a connu une baisse tandis que la détection de médétomidine et de cyclorphine a fortement augmenté. Ceci souligne l'imprévisibilité du contenu des substances psychoactives produites clandestinement.
- Parmi les personnes mentionnant avoir consommé du fentanyl en poudre dans les 3 derniers jours, la proportion ayant rapporté l'avoir fumé a encore augmenté en 2025. Cette proportion est passée de 0% en 2022, à 19% en 2023, à 50% en 2024 et, finalement, à 60% en 2025.
- En 2025, l'inhalation (fumé), comme mode de consommation rapportée lors de la ou des dernières surdoses dans les 6 derniers mois précédant l'entrevue, est aussi en augmentation. Cette donnée a d'importantes implications pour l'intervention auprès des personnes qui consomment par inhalation.