

PARUTION LE 2026-09-28

Direction régionale de santé publique de Montréal

INFO-SUBSTANCE

Avis à la population

FAUX DILAUDID BLANC : CONTIENT DE LA MÉDÉTOMIDINE

Résultat confirmé le 2026-09-22

EFFETS POSSIBLES DE LA MÉDÉTOMIDINE (TRANQUILLISANT VÉTÉRINAIRE)

- Somnolence
- ↓ Fréquence cardiaque (cœur qui bat plus lentement)
- ↓ Pression artérielle (étourdissements, faiblesse)
- Signes de surdose:
 - Inconscience prolongée (ne se réveille pas)
 - Peu ou pas de réaction au bruit et à la douleur
 - Respiration difficile, ronflante ou absente

CONSEILS DE PRÉVENTION SPÉCIFIQUES À LA SUBSTANCE

- Un comprimé blanc vendu comme du Dilaudid (hydromorphone) a été analysé.
 - Il ne contenait **pas d'hydromorphone**. Il contenait **seulement de la médétomidine**.
 - Les effets peuvent être différents de ceux auxquels vous vous attendez.
 - La médétomidine n'est habituellement pas trouvée en comprimés.
- Peu de données existent sur la consommation de la médétomidine en comprimés, puisqu'elle n'est pas commercialisée.
- Il est **difficile de différencier un vrai comprimé d'un faux** selon l'apparence et le poids.

COMMENT PRÉVENIR LES SURDOSES MORTELLES

- **Diminuer** la dose de drogue pour tester ses effets.
- Utiliser les **services de vérification des drogues**.
- Utiliser les **services de consommation supervisée**.
- **Éviter de consommer seul**. Sinon, avertir quelqu'un et rester en contact pendant la consommation :
 - **Accompagnement à distance en prévention des surdoses (ADPS)**: 1-800-265-2626 option 2
 - **National Overdose Response Service (NORS)** 1-888-688-6677
- Avoir de la **naloxone** disponible en quantité suffisante et savoir l'utiliser lors d'une surdose. Ne pas hésiter à l'utiliser (aucun danger même si non nécessaire).
- En groupe, éviter de consommer en même temps. Quelqu'un doit pouvoir aider.
- Éviter de consommer plusieurs substances en même temps.
- **Appeler le 911** en cas de surdose.

POUR PLUS
D'INFORMATION



L'ANONYME



Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal

Québec



Direction régionale de santé publique de Montréal

INFO-SUBSTANCE

FAKE WHITE DILAUDID : CONTAINS MEDETOMIDINE

Result confirmed on 2026-09-22

POSSIBLE EFFECTS OF MEDETOMIDINE (VETERINARY TRANQUILIZER)

- Drowsiness
- ↓ Heart rate (slower heart beat)
- ↓ Blood Pressure (dizziness, weakness)
- In overdose:
 - Prolonged unconsciousness (cannot wake up)
 - Little or no response to noise or pain
 - Difficult, snoring, or absent breathing

SUBSTANCE-SPECIFIC PREVENTION ADVICE

- A white tablet sold as Dilaudid (hydromorphone) was analyzed.
 - It did **not** contain any **hydromorphone**. It contained **only medetomidine**.
 - This could cause unexpected effects.
 - Medetomidine is not usually found in tablet form.
- There is limited data on the consumption of medetomidine in tablet form, as it is not commercially marketed.
- It is **difficult to differentiate a real pill from a fake one** based on its appearance and its weight.

HOW TO PREVENT FATAL OVERDOSES

- **Reduce** the dose of a drug to test its effects.
- Use **drug checking services**.
- Use **supervised consumption services**.
- **Avoid using alone**. Or, notify someone and stay in contact while taking the substance :
 - **National Overdose Response Service (NORS)** 1-888-688-6677
 - **Accompagnement à distance en prévention des surdoses (ADPS)**: 1-800-265-2626 option 2
- Have **naloxone** close at hand in large enough quantities and know how to use it in case of an overdose. Don't hesitate to use it (not dangerous even if it isn't necessary).
- When using with other people, don't all use at the same time.
- Avoid using multiple substances at the same time.
- **Call 911** if there is an overdose.

FOR MORE
INFORMATION



SpekCheck



L'ANONYME



Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal

Québec

