

Risque de décès et de surdose sévère liés à la consommation de comprimés bleus

La Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (DRSP de Montréal) a reçu le signalement d'une personne présentant les signes et symptômes d'une surdose sévère avec détresse respiratoire nécessitant les soins intensifs et une hospitalisation prolongée. Cet événement est survenu à la suite de la consommation d'un comprimé bleu de forme arrondie ayant l'inscription "A/215". Ce produit semble être une contrefaçon d'un comprimé d'oxycodone 30mg, un opioïde normalement disponible sous prescription médicale. À l'heure actuelle, cet événement est toujours sous enquête et le contenu de ces comprimés n'est pas encore confirmé.

Par le passé ([Alerte surdose 5 novembre 2020-1.pdf \(santemontreal.qc.ca\)](#)), des comprimés semblables ont circulé sur le marché illicite et contenaient de l'isotonitazène, un opioïde de synthèse plus puissant que le fentanyl. Les opioïdes sont associés à des risques élevés de décès surtout chez des consommateurs qui pourraient être exposés à leur insu. Lors d'une surdose d'opioïdes, une personne risque de présenter les symptômes suivants : *somnolence importante, ronflements, myosis (pupilles contractées), difficultés respiratoires et cyanose (lèvres et ongles bleutés)*. Ces symptômes sont susceptibles d'évoluer vers un *arrêt cardio-respiratoire*.

Pour renverser les effets d'une surdose, la naloxone est nécessaire. En cas de surdose, appelez le 911 immédiatement pour une intervention rapide et optimale. Une prise en charge en milieu hospitalier pour administration de naloxone sous supervision médicale ou gestion des voies respiratoires pourrait être requise.

Nous vous invitons à être vigilants et à nous informer de toute situation inhabituelle en utilisant la [fiche de signalement de surdose](#).

https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/Surdoses/Alertes-outils/Fiche_Signalement_Surdose_vfinale_septembre2021.pdf

La DRSP de Montréal invite les consommateurs de drogues de rue, quel que soit le mode de consommation (par ingestion, par inhalation, par injection ou autre), à être prudents et encourage cliniciens et intervenants à rehausser les interventions de prévention des décès auprès de ceux-ci :

1. Faire circuler l'information concernant le risque de surdose sévère et de décès liés à la consommation de comprimés bleus ayant l'apparence décrite ci-haut.
2. Offrir un counseling sur les pratiques de consommation à risques réduits :
 - pour les personnes qui consomment par injection, fréquenter régulièrement les services de consommation supervisée : <https://santemontreal.qc.ca/population/services/services-dinjection-supervisee>
 - éviter de consommer seul
 - lorsque plusieurs personnes consomment, éviter de consommer tous en même temps
 - Fréquenter les services d'analyse de substances psychoactives ([Public \(santemontreal.qc.ca\)](#))
 - utiliser, si possible, des bandelettes de détection du fentanyl sachant que l'isotonitazène et les autres nitazènes ne pourront pas être détecté par cette mesure
 - diminuer la dose de drogue pour tester ses effets
 - avoir de la naloxone disponible en quantité suffisante et savoir l'utiliser lorsqu'une personne présente des signes de surdose. En cas de doute, ne pas hésiter à l'utiliser (aucun danger même si non nécessaire)
 - appeler le 911 en cas de surdose (la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose assure l'immunité contre les poursuites pour possession simple aux témoins de surdose ayant composé le 911)
3. Renseigner et accompagner au besoin les personnes afin d'obtenir gratuitement la naloxone dans les organismes et pharmacies communautaires inscrits dans le répertoire de l'INSPQ.
<https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/naloxone/index.html>

Pour plus d'informations :

<https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/surdoses/prevention-des-surdoses-liees-aux-drogues/>