

DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE

# INFO-SUBSTANCE

## FAUX DILAUDID 8MG (HYDROMORPHONE) CONTENANT DU N-DÉSÉTHYL ISOTONITAZÈNE

Testé le 2025-04-11 (certifié par analyse confirmatoire)

Valide jusqu'au 2025-05-15

### EFFETS POSSIBLES DES NITAZÈNES

- Euphorie, somnolence, étourdissements, effet antidouleur.
- En surdose :
  - Respiration difficile, ronflante ou absente.
  - Peu ou pas de réaction au bruit et à la douleur.
  - Aussi possible :
    - Lèvres ou ongles bleutés, pupilles contractées.



### CONSEILS DE PRÉVENTION SPÉCIFIQUES À LA SUBSTANCE

- Le N-Déséthyl isotonitazène est un opioïde toxique à faible dose. Une petite quantité est suffisante pour causer une surdose, particulièrement chez quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en consommer.
- Le comprimé a la même apparence qu'un comprimé réel pharmaceutique.
- *Le phénomène n'est pas nouveau, mais dans ce cas-ci, contrairement à certaines pratiques, le dissoudre dans l'eau ne permet pas de distinguer un "vrai" comprimé d'un "faux".*

### COMMENT PRÉVENIR LES SURDOSES MORTELLES

- **Diminuer** la dose de drogue pour tester ses effets.
- Fréquenter les **services de vérification des drogues**.
- Éviter de consommer seul (sinon, informer quelqu'un et rester en contact lors de la consommation, ex : **National Overdose Response Service (NORS)** 1-888-688-6677).
- Avoir de la **naloxone** disponible en quantité suffisante et savoir l'utiliser lors d'une surdose. Ne pas hésiter à l'utiliser (aucun danger même si non nécessaire).
- Fréquenter les services de consommation supervisée.
- Lorsque plusieurs consomment, éviter de consommer en même temps.
- Éviter de consommer plusieurs substances en même temps.
- Appeler le 911 en cas de surdose.

POUR PLUS  
D'INFORMATION



L'ANONYME



Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Centre-Sud-  
de-l'île-de-Montréal

Québec