

INFORMATION SUR LES VACCINS CONTRE LA COVID-19 DISTRIBUÉS AU QUÉBEC – SAISON 2026-2027

	COMIRNATY (30 µg/0,3ml) (Pfizer/BioNTech)	SPIKEVAX (0,10mg/ml) (Moderna)	NUVAXOVID (5 µg /0,5 ml) (Sanofi Pasteur)
Type de vaccin	Vaccin à ARN messenger	Vaccin à ARN messenger	Vaccin à protéine recombinante avec adjuvant
Présentation	Fiole multidose 30 µg / 0,3 ml Fiole multidose de 6 doses Seringue préremplie 30 µg / 0,3 ml Seringue unidose (0,3 ml)	Fiole multidose 0,10 mg / ml Fiole multidose (2,5 ml) Seringue préremplie 50 µg / 0,5 ml Seringue unidose (0,5 ml)	Seringue préremplie 5 µg / 0,5 ml Seringue unidose (0,5 ml)
Posologie et voie d'administration	Ne pas utiliser le Comirnaty 30 µg chez les enfants de moins de 12 ans	Ne pas utiliser la <u>seringue préremplie</u> chez les enfants de moins de 12 ans 6 mois à 11 ans (25 µg) 0,25 ml de la fiole multidose par voie IM	Ne pas utiliser le Nuvaxovid chez les enfants de moins de 12 ans
	12 ans et plus (30 µg) 0,3 ml de la fiole multidose par voie IM - Tout le contenu de la seringue unidose par voie IM	12 ans et plus (50 µg) 0,5 ml de la fiole multidose par voie IM - Tout le contenu de la seringue unidose par voie IM	12 ans et plus (5 µg) Tout le contenu de la seringue unidose par voie IM
Composition	30 µg d'ARN messenger du variant XFG de la souche Omicron; - Lipides : ALC-0315 = bis(2-hexyldécanoate) de((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyle), ALC-0159 = 2-[(polyéthylèneglycol)-2000]-N,N-ditétradécylacétamide, DSPC = 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine et cholestérol; - Trométhamine, chlorhydrate de trométhamine et sucrose; - Chlorure de sodium et eau.	50 µg d'ARN messenger (dose de 0,5 ml) ou 25 µg d'ARN messenger (dose de 0,25 ml) du variant XFG de la souche Omicron; - Lipides : DSPC (1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine), SM-102 (heptadécane-9-yl 8-((2-hydroxyéthyl) (6-oxo-6-(undécyloxy) hexyl) amino) octanoate), polyéthylèneglycol-2000 DMG (1,2-dimyristoyl-rac-glycéro-3-méthoxypolyéthylèneglycol-2000) et cholestérol; - Trométamol, chlorhydrate de trométamol, acide acétique, acétate de sodium trihydraté et sucrose; - Eau.	5 µg de protéine de spicule recombinante du variant XFG de la souche Omicron; - Hydrogénophosphate disodique heptahydraté, dihydrogénophosphate sodique monohydraté, chlorure de sodium, Polysorbate 80, hydroxyde de sodium et acide chlorhydrique; 50 µg de l'adjuvant Matrix-M : fraction A et fraction C de saponines Quillaja saponaria, cholestérol, phosphatidylcholine, dihydrogénophosphate de potassium, chlorure de potassium, hydrogénophosphate disodique dihydraté et chlorure de sodium; - Eau.
Adjuvant	Aucun	Aucun	Adjuvant Matrix-M (voir ci-dessus)
Autres ingrédients	Ces produits ne contiennent aucune trace d'antibiotique, agent de conservation ou latex naturel. Ils ne doivent pas être reconstitués ni dilués.		
Contre-indications	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin, notamment le PEG et la trométhamine	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin, notamment le PEG et la trométhamine	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin, notamment le polysorbate
Précautions	- Antécédent de réaction allergique immédiate non anaphylactique après l'administration d'une dose antérieure - Antécédent de myocardite ou péricardite à la suite d'une dose antérieure d'un vaccin contre la COVID-19 - Antécédent de SGB à la suite d'un vaccin contre la COVID-19 - Antécédent de syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant (SIME)		